

Impfkalender Stand : Juli 2008 nach Empfehlungen der STIKO

Impfstoff /- Kombination	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren					
	Geburt	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-11	12-17	ab 18	ab 60
Wundstarrkrampf (Tetanus)		1.	2.	3.	4.		A	A		A (c)	
Diphtherie		1.	2.	3.	4.		A	A		A (c)	
Keuchhusten (Pertussis)		1.	2.	3.	4.		A	A			
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)		1.	2.(a)	3.	4.						
Kinderlähmung (Polio)		1.	2.(a)	3.	4.			A			
Hepatitis B	1.		2.(a)	3.	4.			G			
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.						S
Meningokokken					1.(b)						
Masern, Mumps, Röteln (MMR)					1.	2.					
Windpocken (Varizellen)					1.	2.(d)		(e)			
Grippe (Influenza); jährlich mit aktuellem Impfstoff											S
HPV (Humane Papillomaviren) Impfung mit 3 Dosen									SM		

- A** Auffrischungsimpfung : Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen
- G** Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes
- S** Standardimpfungen **SM** Standardimpfung für Mädchen
- (a)** bei Einzelimpfstoffen oder Impfstoffen ohne Keuchhustenanteil kann diese Dosis entfallen
- (b)** ab dem vollendeten 12. Lebensmonat **(c)** Auffrischung alle 10 Jahre
- (d)** Bei Verwendung eines MMR- Varizellen- Impfstoffes : Gabe einer 2. Dosis bevorzugt nach 6 Wochen (mindestens 4 Wochen)
- (e)** Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder- Impfung